



1° Corso per

FORMATORI di CAREGIVER in ONCOLOGIA

*Un percorso di
Informazione e Formazione*

Presidenti del Convegno: Carmine Pinto e Fabrizio Nicolis

MILANO | 30.03.2017

Terapie: Addestramento alla somministrazione

Elena Landucci

DH Oncologia Medica

Presidio Ospedaliero
della Versilia

USL Area Vasta Toscana
Nord-Ovest



I protocolli terapeutici prevedono l'utilizzo di

- 1. Agenti chemioterapici**
- 2. Terapie a bersaglio molecolare**
- 3. Immunoterapie**




Caregiver/Navigatore terapeutico

1. **Accompagnando sempre il paziente nei luoghi di cura al fine di assicurargli la comprensione di tutte le informazioni riguardanti la terapia e i suoi effetti collaterali**
2. **Riferendo puntualmente sugli effetti collaterali in termini di insorgenza, durata, efficacia o meno delle terapie prescritte per prevenirli o controllarli**
3. **Mantenendo un canale comunicativo sempre aperto con il team di cura**



Caso 1 (a)

- Donna di anni 44 affetta da carcinoma mammario operato che ha eseguito in data odierna il primo ciclo di chemioterapia adiuvante secondo il seguente schema:
 - Epirubicina 90 mg/mq e.v. bolo (dose totale 159 mg) giorno 1
 - Ciclofosfamide 600 mg/mq e.v. bolo (dose totale 1062mg) giorno 1Con cicli da ripetere ogni 21 gg
- Il prossimo appuntamento è previsto...
- Consigliamo, in aggiunta alla consueta terapia domiciliare, la seguente terapia:
 - Desametasone 128 gtt dopo colazione per 3 gg
 - Aprepitant 80 mg 1 cp/die per due gg
 - In caso di diarrea: Loperamide 2 mg, 2 cp dopo la prima scarica quindi 1 compressa dopo ogni scarica successiva fino a un massimo di 6 cp/die



Caso 1 (b)

- In caso di nausea persistente o vomito:
 - Ondansetron 8 mg 1 cp per 2/die per un massimo di 2 gg
- In caso di febbre:
 - Paracetamolo 1000 mg 1 cp ripetibile ogni 8/12 ore
- In caso di febbre > di 38.5, contattare i medici ai seguenti numeri... per eseguire emocromo con formula urgente
- In caso di stipsi:
 - Lattulosio sciroppo 2 cucchiaini/sera
- In caso di mucosite:
 - Fluconazolo sospensione orale 1 mis. per os 3 volte/die lontano dai pasti



In caso di urgenza e per eventuali chiarimenti contattare i medici e gli infermieri ai seguenti numeri...

Caso 2 (a)

- Uomo di anni 66 affetto da carcinoma del colon avanzato che ha eseguito in data odierna il primo ciclo di chemioterapia di seconda linea (con dose ridotta del 25%) secondo il seguente schema:
 - Irinotecano 180 mg/mq e.v. (dose totale 211 mg) giorno 1
 - 5-FU 400 mg/mq bolo (dose totale 468mg) giorno 1, 2
 - 5-FU 1200 mg/mq i.c. 48h in pompa elastomerica (dose totale 1404 mg) giorno 1
da ripetere ogni 2 settimane
- Il prossimo appuntamento è previsto...
- Consigliamo, in aggiunta alla consueta terapia domiciliare, la seguente terapia:
 - Desametasone 128 gtt dopo colazione per 2 gg
 - In caso di diarrea: Loperamide 2 mg, 2 cp dopo la prima scarica quindi 1 compressa dopo ogni scarica successiva fino a un massimo di 6 cp/die

Caso 2 (b)

- In caso di nausea persistente o vomito:
 - Ondansetron 8 mg 1 cp per 2/die per un massimo di 2 gg
- In caso di febbre:
 - Paracetamolo 1000 mg 1 cp ripetibile ogni 8/12 ore
- In caso di febbre > di 38.5, contattare i medici ai seguenti numeri... per eseguire emocromo con formula urgente
- In caso di stipsi:
 - Lattulosio sciroppo 2 cucchiaini/sera
- In caso di mucosite:
 - Fluconazolo sospensione orale 1 mis. per os 3 volte/die lontano dai pasti
- In caso di urgenza e per eventuali chiarimenti contattare i medici e gli infermieri ai seguenti numeri...



Grazie per l'attenzione



**1° Corso
per Formatori di Caregiver
in Oncologia**

Milano, 30 marzo 2017